lüe deux fois

Observation — hidrosarcocele

des Maladies qui arrivent aux organes de la generation de l'homme, le Schirre du Cordon des vaisseaux Spermatiques est sans contredit une des plus facheuses; puisque quand il gagne la ~~tige des vaisseaux~~ Vaine il est mortal, et que lorsqu'il est malade au dessous ou au dessus de l'anneau il entraine necessairement la perte du Testicule; c'est de ce dernier cas dont je vais rendre conte a l'accademie.

Un homme agé de trente et un an vint me consulter au mois d'aout 1754 pour un Testicule qui avoit grossi peu a peu depuis 14 mois au point d'en être incommodé par le poids, et pour lequel mal il avoit employé les saignées, le repos, la diette severe, les Bains, les douches, les Cataplasmes emolliens et des fondants de touttes especes soit pris interieurement soit appliqué exterieurement; quoique ce mal n'eut pris sa naissance que depuis une chutte de Cheval dans laquelle il s'etoit froissé legerement cet organe au pommeau de la selle.

le Suspensoir

La Maladie examinée offroit aux yeux une masse du poids de plus d'une livre et par le touché on distinguoit de l'eau epanchée dans une cavité avec dureté tres manifeste de l'Epididime et du Cordon lequel a l'estimation pouvoit avoir deux poulces de diamettre; cet état contre nature paroissoit se borner cinq ou six lignes au dessous de l'anneau, c'est le jugement qu'en porterent Mrs Morand, Chauvin, Guerin la porte et moi: L'état du malade constaté, il se determina a se faire operer au mois d'octobre de la ditte année, après y avoir été preparé par six jours de diette, une boisson abondante trois saignées et deux purgatifs doux: je lui fis donc la Castration en presence de Mrs Morand, la Porte et le Vacher fils gaignant ~~maitrise~~ demonstrateur en anatomie; je fendis le Scrottum, le muscle Cremaster et decouvris le Cordon et le sac qui contenoit les eaux que je ne viudai point pour avoir plus d'aisance a dissequer le Total de la

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE
26 3247
ARC 18d. 6 n° 6
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Tumeur; je prolongeai l'incision des Tegumens un pouce et demi audessus de l'anneau, Enfin le Testicule et ses dependances etant isolés je tatai le cordon ou il nous avoit paru dans son état naturel et le trouvai excedant sa grosseur (~~naturelle~~ ordinaire) de plus de moitié et squirreux; je le liai dans cet endroit avec un cordonnet formé de trois brins de gros fil de Bretagne ciré je serrai d'autant plus fort la ligature que je m'apperçu sensiblement que le fil ne faisoit pas l'impression qu'il fait sur un corps mol; je coupai de la peau du scrotum ce qui m'en parut trop etendu, je coupai aussi le cordon deux pouces endeça de la ligature, j'arretai l'artere de la cloison et quelques autres arterioles avec l'Eau de Rhabel et la charpie et j'appliquai un appareil convenable pour que le Testicule sain ne fut point gené. quatre heures après l'operation je saignai le malade et fus obligé de la repeter encore deux fois dans la nuit qui suivit ~~l'operation~~ la a cause de la douleur, des hoquets, des vomissemens et des saccades très fortes dans les tendons des doigts.

Le lendemain matin qui faisoit apeu près les 24 heures de l'operation le malade continuoit de vomir ce qu'il prenoit, la fievre se mit de la partie et les saccades des tendons (~~continuellement~~ la poitrine); se plaignant de plus d'une douleur dans la region lombaire qui repondoit au trajet des vaisseaux liés;+ je lui fais une potion calmante et absorbante dont le malade ne voulut point, et les vomissemens et les hoquets s'etant soutenus toutte la journée malgré très peu de limonade dont il avoit fait usage nous lui fimes prendre un demi grain d'opium le soir qui calma les accidens enoncés cy dessus excepté le hoquet qui etoit toujours fort importun, l'appareil fut arosé avec l'huile Rosat, l'opium fut continué a la dose d'un grain pendant cinq jours tems ou il ne se passa rien de remarquable; le 6 et 7me la charpie tomba la portion exterieure du cordon lié se decouvrit et excedoit de deux tiers la grosseur

+ je fomentai le ventre avec les pl. et l'huile Rosat

quil avoit avant detre lié a pour une couleur brunne ou de caffé brullé et d'une odeur tendante a la putrefaction. du j'aues les pansements furent continués methodiquement et la portion externe du cordon lié se depouilla d'une masse brunne et puante qui laissa entrevoir que le gros de la tumeur restante prenoit vie et s'etoit un peu amollie, nous passames deux jours dans l'observation et le 18 nous resolumes de faire une ligature un peu au dessus de la premiere s'il etoit possible; pour cet effet je fis faire (du dessein donné par Mr. Morand) un instrument pour la saisir au collet; mais les doigts en firent l'office et cette tumeur saisie par moi avec de la porte en presence de Mr. Morand, fut tirée moderement en dehors. je plaçai un nouveau fil et je trouvai son impression sur le cordon aussi renittente que la premiere fois; cependant apres cette ligature la tumeur devint brunne et nous parut être privée de vie; la plus part des accidens dont j'ai parlé plus haut recommencerent et furent calmés par l'opium que le malade repeta pendant trois jours ce qui faisoit le 21 de l'operation. le 26 la portion exterieure du cordon parut encore être nourrie, la ligature s'etant vraisemblablement laché par une espece de fletrissure des parois exterieurs du cordon; je fis de nouveau avec les bouts du fil que j'avois ~~laissé~~ laissé fort long le nœud du chirurgien que je serrai de deux jours l'un jusqu'au trente deux de l'operation; le malade fatigué alors des hoquets, des envies de vomir et de la douleur que lui causoit cette pression n'en voulut plus entendre parler quoiqu'il s'apercut visiblement que sa tumeur brunissoit; nous la cessames; et le 34 de l'operation nous fimes la torsion de la portion externe du cordon par gradation; de sorte que la masse liée fit le tour entier en quatre jours, mais il est remarquable que la premiere fois que je la fis le cordon parut se casser avec + un bruit pareil a celui que l'on entend quand on fend un abricot qui n'est pas dans sa parfaitte maturité, et toutte les fois que j'ai pratiqué cette torsion le malade a toujours eu des hoquets, de la douleur dans

observation M Dup

+ de bruit la sensation pour moi seul

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

La regioɳ lombaire du coté operé et quelques fois un peu de liberté de ventre ce qui nous determina a le purger le 39 de l'operatioɳ, tems ou la playe du Scrotum étoit guerie.

La Maigreur du Malade nous permettoit aisement de juger du cordoɳ au dessus de l'anneau et son état qui nous avoit toujours paru plus gros que l'etat sain jusqu'au jour de la torsion, s'efaça si absolument au 42 de l'operatioɳ qu'on ne le sentoit presque plus; tems ou la portioɳ torse et liée tomba en pourriture, n'etant guere plus grosse alors qu'une noix, elle nous decouvrit des chairs bien grennues qui firent un corps de cicatrice solide le 54me de l'operatioɳ et le malade etoit si parfaitement retabli au bout d'un mois de convalescence qu'il fit une routte de plus de cent lieues dans un tems d'hiver très rude; il me reste Messieurs a vous faire la descriptioɳ des parties couppées, et d'ajoûter une courte reflectioɳ a l'historique de la curatioɳ de ce mal.

Descriptioɳ

Le Sac formant l'hydrocelle avoit l'epaisseur ~~d'un~~ d'une piece de vingt quatre sols et contenoit environ une poilette d'une liqueur roussâtre ayant l'odeur des eaux de cataracte qui ont souffert le transport a Paris, le cordon dans l'endroit coupé avoit trois pouces deux lignes de circonference et étoit de la dureté des cartillages qui unissent les cotes au sternum d'un sujet de 25 ans, cette dureté étoit commune a l'epididime qui embrassoit les deux tiers du testicule, ce même testicule fendu se trouvoit sain dans presque toutte sa partie glanduleuse il n'y avoit que sa partie tout a fait inferieure qui participoit du schirre de l'epididime ce qui avoit au plus quatre lignes d'epaisseur, car aprés l'avoir laissé macerer quelques jours que j'ai essayé de separer cet espece de rocher du testicule

Reflectioɳ

Dans l'exposé que je viens de faire on voit que le cordon lié dans sa

partie Schirreuse, coutu par les differentes prestions du fil et par la torsion s'est enflammé, amolli par la suppuration, et enfin est devenue assez sain au delà de la ligature pour s'adunner au voisinage de l'anneau par une bonne cicatrice; de la il semble qu'on pourroit se comporter de même dans les cas pareils; cependant je doutte que la nature puisse être toujours aussi favorable aux vœux de l'operateur, et j'avoue que sans une authorité aussy respectable que celle de Mr Morand, j'eusse fendu l'anneau et lié le cordon dans le lieu sain s'il m'eut été possible, et sans doutte que c'est la parité des faits de ce celebre praticien qui l'ont fait prononcer sur cette methode. j'ajouterai que ce qui m'a toujours paru un signe favorable pour le malade, c'est que dans telle attitude qu'il fut avant d'etre operé il ne ressentoit jamais de douleurs au dos ny aux lombes; excepté que la tumeur ne fut abandonnée a son propre poids. Dupont

No. 6